

Tardit Mega 3-4 M



Umhüllter Langzeitdünger, Wirkungsdauer 3-4 Monate.

Die Tardit Mega Dünger enthalten NPK, Magnesium sowie allen notwendigen Spurenelementen in umhüllter Form. Dank der Umhüllungstechnologie wirken die Tardit Mega Dünger während definierten Laufzeiten und garantieren deshalb eine sicher Langzeitversorgung der Kulturen.

- Kontrollierte und kontinuierliche Nährstoffabgabe durch Umhüllungstechnologie.
- Vollständige Nährstoffversorgung, incl. Spurenelementen
- Präzise Nährstofffreisetzung über 3-4 Monate

Anwendung

Für mittelspäte Topftermine in Baumschulen, für Stauden, für Kurzkulturen von Zierpflanzen zur Unterhaltsdüngung von Rabatten mit späten Pflanzterminen (Juni / Juli). Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Beimischung ins Substrat sollte direkt vor der Verwendung erfolgen. Aufgedüngtes Substrat kann maximal 14 Tage gelagert werden, sofern es trocken ist und sich nicht erwärmt. Je nach Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Die Wirkungsdauer von Tardit Mega wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21 °C.

Dosierungsanleitung

Baumschule bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 1-2 g/l

Mittel 1.5-2.5 g/l

Hoch 2.5-3.5 g/l

Zier- und Topfpflanzen bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 1-2 g/l

Mittel 2-3 g/l

Hoch 3-4 g/l

Rabatten und Beetpflanzen bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 40-50 g/m²

Mittel 50-60 g/m²

Hoch 60-80 g/m²

Zu beachten

Für mittelspäte Topftermine in Baumschulen, für Stauden, für Kurzkulturen von Zierpflanzen zur Unterhaltsdüngung von Rabatten mit späten Pflanzterminen (Juni / Juli). Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Beimischung ins Substrat sollte direkt vor der Verwendung erfolgen. Aufgedüngtes Substrat kann maximal 14 Tage gelagert werden, sofern es

trocken ist und sich nicht erwärmt. Je nach Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Die Wirkungsdauer von Tardit Mega wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21 °C.

Marke Hauert

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

- **18 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 7.5 % Nitratstickstoff
 - 9.2 % Ammoniumstickstoff
 - 1.3 % Carbamidstickstoff
- **8 % Gesamtphosphat (P_2O_5)**
 - 6 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5)
- **10 % Gesamtkaliumoxid (K_2O)**
- **2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **0.031 % Gesamtkupfer (Cu)**
- **0.13 % Gesamteisen (Fe)**
- **0.018 % Mangan (Mn)**
- **0.006 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.008 % Gesamtzink (Zn)**
- **100 % Langzeitstickstoff**