

Osmocotekugeln



Einfache und exakte Dosierung

Wie bei allen Osmocote Exact Produkten ist auch bei den Osmocote Exact Tablets 5-6M die Wirkungsdauer an einem Anteil braungefärbter Körner leicht zu erkennen. Osmocote Exact Tablets 5-6M sind in 5 g Tabletten.

- Hohe Nährstoffeffizienz durch punktgenaue Applikation
- Niedrige Salzbelastung, Hohe Spurenelementgehalte
- Kontrollierbare Nachdüngung, Gleiche Düngermenge pro Topf/Container

Anwendung

Osmocote Exact Tablets 5-6M sind ideal für die Nachdüngung im Baumschul- und taubenbereich und bei Hanging-Baskets, Ampeln sowie Hochstämmchen. Durch den gezielten Einsatz von Osmocote Exact Tablets lassen sich Nährstoff-Bedarfsunterschiede in Tischbepflanzungen ausgleichen. Beim Einsatz von Tropfbewässerungssystemen sollten die Osmocote Exact Tablets 5-6M möglichst im Bereich der Tropfstelle appliziert werden. Die Wirkungsdauer von Osmocote Exact wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21°C.

Dosierungsanleitung

Empfohlene Dosierungen in g/l - eine entsprechende Anzahl Tablets muss ermittelt werden:

Baumschule:

- Laufzeit 5-6M: 3-4 g/l
- Laufzeit 8-9M: 4-5 g/l

Azaleen / Rhododendron:

- Laufzeit 5-6M: 2-3 g/l
- Laufzeit 8-9M: 3-4 g/l

Topfpflanzen

- Laufzeit 5-6M: 3-4 g/l
- Laufzeit 5-9M: 4-5 g/l

Ampeln

- Laufzeit 5-6M: 3-5 g/l
- Laufzeit 5-9M: 4-6 g/l

Rechenbeispiel:

Granulat-Ausbringung

- 3 Liter Topf-Volumen

- 5 g/l Osmocote Exact
Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10, www.hauert.com
-

- Total = 15 g/Topf

Tabletten-Ausbringung

- 3 Liter Topf-Volumen
- 3 x 5 g Osmocote Exact Tablet
- Total = 15 g/Topf

Zu beachten

Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Je nach Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Bitte beachten Sie, dass es sich um allgemeine Empfehlungen handelt. Kulturspezifische Empfehlungen erhalten Sie von Ihrem Fachberater.

Marke ICL

Saison Frühling, Sommer, Herbst, Winter

Lagerung

Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Unbeschränkt haltbar.

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

- **14 % Gesamtstickstoff (N)**
- **8 % Gesamtphosphat (P_2O_5)**
- **11 % Gesamtkaliumoxid (K_2O)**
- **2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **0.01 % Bor (B), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.046 % Gesamtkupfer (Cu)**
- **0.41 % Gesamteisen (Fe)**
- **0.05 % Mangan (Mn)**
- **0.018 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.013 % Gesamtzink (Zn)**