

Hortobalance Top



Granulierter Aufstreu Dünger mit Langzeitwirkung zum Nachdüngen von Containerkulturen. HortoBalance® Top verbindet sich nach dem Aufstreuen mit dem Substrat. Egal ob der Container kippt oder ob er verladen wird, HortoBalance® Top bleibt auf dem Substrat kleben.

- Aufstreu Dünger mit unterschiedlichen Wirkmechanismus für maximale Sicherheit
- Mit Mehrfach-Langzeit-Technologie
- Wirkt 6 - 7 M
- Mit Klebeeigenschaft

Anwendung

Nachdüngung von Containerpflanzen: HortoBalance® Top zwischen Containerrand und Stamm auf Substrat streuen. Idealer Zeitpunkt: März bis Mai.

Dosierungsanleitung

- **Empfindliche Kulturen:** 2,5 g/Liter Substrat
- **Verträgliche Kulturen:** 3 g/Liter Substrat
- **Bedürftige Kulturen:** 3,5 g/Liter Substrat

Zu beachten

Saison Februar, März, April, Mai, Juni

Marke Hauert

Lagerung

Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Unbeschränkt haltbar.

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

- **17.5 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 4 % Nitratstickstoff
 - 6.5 % Ammoniumstickstoff
 - 7 % Methylenharnstoff
- **7.5 % Gesamtphosphat (P_2O_5)**
 - 6.2 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5)
- **11.5 % Gesamtkaliumoxid (K_2O) , 11.5 % wasserlöslich**
- **0.015 % Bor (B), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.015 % Gesamtkupfer (Cu)**
- **0.3 % Gesamteisen (Fe) , 0.3 % als Chelat**
- **0.05 % Mangan (Mn)**
- **0.007 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.006 % Gesamtzink (Zn)**
- **Chlorarm**
- **Kalkfrei**
- **88 % des Stickstoffs als Langzeitstickstoff (N umhüllt, Nrf)**
- **NPK (+Mg)-Dünger 17,5+7,5+11,5 (+1,6) mit Methylenharnstoff und Spurennährstoff, umhüllt**